

**UWAGA**  
**ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW**

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w Europie zachodniej (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) stwierdzono już kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia tej jednostki chorobowej na terytorium Rzeczypospolitej polskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że:

1. Potencjalnym źródłem zarażenia są dzikie ptaki, fermy należy zabezpieczyć tak, aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz z paszą. Szczególną ostrożność należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych.
2. Hodowca powinien sprawdzać wpisy potwierdzające przeprowadzenia dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy. Należy wizualnie oceniać skuteczność mycia i dezynfekcji tych pojazdów
3. Nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości i daje niespecyficzne objawy np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji , śmiertelność jest umiarkowana. W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 i zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia tej choroby. Zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez kontakt pośredni: na przykład z zakażoną wodą do picia, paszą. Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez sprzęt, środki transportu, człowieka
- 4. Przy nieprzestrzeganiu zasad bioasekuracji zarówno hodowca jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków**

